

## TERAPIA PER LA GIARDIA NEL CANE E NEL GATTO

\* controlla che i farmaci siano attualmente registrati in Italia



SPECIE	PRINCIPIO ATTIVO	POSOLOGIA PER OS	DURATA TERAPIA	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	REPERIBILI QUI	NOTE
<b>cane</b>						
	metronidazolo	22 mg/kg due volte/giorno	5 gg	Payne 2011	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19932359">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19932359</a>	altri Autori 15-25 mg/kg
	fenbendazolo	50 mg/kg	3-5 gg			
	febantel-pyrantel-praziquantel associati	37.8 mg/kg, 7.56 mg/kg, 7.56 mg/kg rispettivamente	3-5 gg			utile in caso di infestazioni concomitanti con altri parassiti
	ronidazole	30-50mg/kg due volte/giorno	7 gg	Fiechter et al. 2012	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240238">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240238</a>	alcuni riportano rischio di effetti collaterali nervosi per sovradosaggio o utilizzo prolungato
	tinidazolo	44 mg/kg	6 gg	Tangtrongsup e Scorza 2010	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937499">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937499</a>	
	ipronidazolo	126 mg/L di acqua	ad libitum 7 gg			può essere utile nei canili o allevamenti
	azythromicina	10 mg/kg	5 gg	Zygner 2008	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18942546">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18942546</a>	
	albendazolo	25 mg/kg due volte al giorno (vedi nota)	2 gg	Payne 2011; Tangtrongsup e Scorza 2010	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937499">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937499</a>	non più raccomandato x rischio di effetti collaterali
<b>gatto</b>						
	fenbendazolo	50 mg/kg	5-7 gg	Gruffydd-Jones et al., 2013	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813834">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813834</a>	
	metronidazolo	25 mg/kg	5 gg			a 50 mg/kg rischio di gravi effetti collaterali
	secnidazole	30 mg kg(-1)	unica dose	da Silva et al., 2011	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21763779">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21763779</a>	
	ronidazolo	30 fino a 50 mg/kg	14 gg	Gookin et al, 2006		alcuni riportano rischio di effetti collaterali nervosi per sovradosaggio o utilizzo prolungato
	furazolidone	4 mg/kg, due volte al giorno	7-10 gg	Tangtrongsup e Scorza 2010	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937499">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937499</a>	bella review, ma bisogna essere abbonati
	quinacrine	11 mg/kg	12 gg			